

Czy słyszysz to, co ja słyszę?



Maluchy używają swoich zmysłów—zwłaszcza słuchu—do odkrywania świata. Chwilowa lub stała utrata słuchu u dziecka, może być spowodowana częstymi infekcjami ucha, urazami lub chorobą. Utrata słuchu może powodować zwolniony rozwój mowy i inne problemy związane z uczeniem się. Prawo stanu Illinois wymaga, aby wszystkie położnicze szpitale badały słuch u noworodków. Badanie słuchu u dzieci jest też obowiązuje w żłobkach i w przedszkolach. Rodzice i nauczyciele pełnią ważną rolę w obserwowaniu dzieci pod kątem zaburzeń w rozwoju słuchu.

Jak wygląda normalny rozwój słuchu?

- Każde trzymiesięczne niemowlę powinno reagować na głos swoich rodziców. W wieku sześciu miesięcy, dziecko powinno obracać głowę w kierunku dźwięku.
- Normalnie rozwijające się dziecko zaczyna naśladować dźwięki lub niektóre słowa, w wieku dwunastu miesięcy. Maluch będzie także próbował powiedzieć słowa, jak „mama” lub „bye”.
- Dwuletnie dziecko rozumie słowa komunikujące czynności, takie jak: „biegnij”, potrafi także wykonywać proste instrukcje słowne.

Porozmawiaj z rodzinnym pediatrą, o innych metodach sprawdzania słuchu u dzieci. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z American Speech—Language—Hearing Association, pod numerem 1-800-638-8255.

Jakie są najczęściej spotykane objawy utraty słuchu?

- Dziecko z utratą słuchu może wydawać się nieuważne albo oporne.
- Maluch ten nie będzie rozumiał wszystkich słów, lub będzie słyszał tylko niektóre dźwięki.
- Będzie oglądał telewizor albo słuchał radia głośniej.
- Dziecko takie może robić wrażenie, że nie zapamiętuje dobrze lub mówi niewyraźnie.

Co powinnaś zrobić, jeżeli podejrzewasz że twoje dziecko ma problemy ze słuchem?

Spytaj się lekarza rodzinnego, czy twoje dziecko powinno mieć zbadany słuch przez specjalistę.

Jak ważne jest leczenie?

Wczesne rozpoznanie, jak i leczenie wad słuchu jest bardzo ważne. Naukowe badania wykazały, iż dzieci urodzone z wadą słuchu, zaczynają szkołę w normalnym czasie, jeżeli odpowiednia opieka nad dzieckiem rozpocznie się przed szóstym miesiącem życia. Leczenie polega na znalezieniu zasadniczych powodów utraty słuchu, dokonaniu zmian w otoczeniu, wprowadzeniu odpowiednich ćwiczeń, używaniu narządów słuchu lub operacji. Wczesne rozpoznanie utraty słuchu i podjęcie natychmiastowego leczenia zapobiega problemom związanym z uczeniem się i społecznym rozwojem dziecka.

Opinie i wskazówki zawarte na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje tutaj podane nie mogą być traktowane jako porady medyczne i nie zastępują diagnozy lekarskiej ani właściwego leczenia medycznego. Radzimy rodzicom, aby z pytaniami na temat stanu zdrowia ich dzieci zwracali się do lekarzy lub innych wykwalifikowanych przedstawicieli służby zdrowia.

English Title: Do You Hear What I Hear?



29 Children's Research Center
51 Gerty Dr. • Champaign, IL 61820-7469
Telefon: 217-333-1386 • Fax: 217-244-7732
Za darmo: 877-275-3227 (Voice/TTY)
Email: iel@uiuc.edu
Internet: <http://illinoisearlylearning.org>

Illinois State Board of Education

Więcej stron z poradami możesz znaleźć pod adresem <http://illinoisearlylearning.org>